

# El Uso de Substancias y el genero en las Américas



**OEA** | Más derechos  
para más gente



OEA

Más derechos  
para más gente

# El Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID)


- Área de investigación y análisis de la Comisión Interamericana para el control del abuso de drogas (CICAD),
  - Comisión técnica de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
- Misión crear un sistema de información para el hemisferio que cuenta con datos confiables, validos y actualizados.



## Las tendencias del consumo de alcohol en escolares secundarios están en baja, sin embargo...


- En 21 de 31 países, en escuelas secundarias el 20% o mas jóvenes han consumido alcohol en el último mes
- En 15 países, del 30%
- Uso en estudiantes del 8º grado
  - En 10 países mas del 20% consumieron en el último mes
  - En 3 mas del 30% del 8º grado
- Genero: Consumo entre varones y mujeres es similar en América Latina.
- En aproximadamente la mitad de los países Caribeños las mujeres consumen mas que los varones.

## Prevalencia de último mes de consumo de alcohol en estudiantes del nivel secundario por sexo, según país y subregión



## Binge drinking

- *Binge drinking:* En 17 de 20 que recolectan estos datos - 50% de escolares reportan *binge drinking*.
- En la EUA el 54.6% de chicas escolares secundarias que consumieron alcohol en el último mes reportaron *binge drinking*.



*Binge drinking = Entre consumidores del último mes, 5 tragos o mas en una sola ocasión, durante (periodo 2 semanas antes de la encuesta)*

# Marihuana




OEA

Más derechos  
para más gente


## Prevalencia del último año de marihuana en la población general (12-64 años), por sexo

- Aumentos en ambos sexos
- Uso mas alto en los varones


Argentina




Chile




Costa Rica



Mexico



Uruguay




# Past year prevalence of marijuana use among high school students




Note difference in scales

- Aumentos en ambos sexos
- Brecha de genero disminuye


## Argentina




## Chile




## Costa Rica



## Paraguay




## Uruguay




# Percepción de Riesgo

Mientras baja la percepción de riesgo, aumenta la prevalencia



## Prevalencia del último año del consumo de cocaína, por sexo y subregión




# Cocaína



# OEA

Más derechos  
para más gente

## Prevalencia del último año del consumo de cocaína, por sexo y subregión




# Crack y otras cocaínas fumables



OEA


Más derechos  
para más gente

## Prevalencia de vida del consumo de **pasta** **base** en escolares secundarios, por sexo



- █ Females
- █ Males

## Prevalencia de vida del consumo de **crack** en escolares secundarios, por sexo y subregión




# Crack y otras cocaínas fumables



OEA


Más derechos  
para más gente

## Prevalencia de vida del consumo de **pasta** **base** en escolares secundarios, por sexo




- █ Females
- █ Males


## Prevalencia de vida del consumo de **crack** en escolares secundarios, por sexo y subregión



## Prevalencia del último año de “éxtasis” en escuelas secundarios, por sexo y subregión



## Prevalencia del último año de inhalables en escolares secundarios, por sexo, y subregión




# Uso Indebido de Fármacos



OEA

Más derechos  
para más gente

Prevalencia de último año de consumo de **tranquilizantes** sin prescripción médica en estudiantes secundarias, por país, ordenado por subregión




# Uso Indebido de Fármacos



# OEA


Más derechos  
para más gente

Prevalencia de último año de consumo de **tranquilizantes** en estudiantes de enseñanza secundaria según sexo, por país, ordenado por subregión







## Gráfico 7-2: Prevalencia de último año de consumo de tranquilizantes sin prescripción médica en la **población general** según sexo, por país, ordenado por subregión



## Gráfico 7-8: Prevalencia de último año de consumo de tranquilizantes sin prescripción médica en estudiantes universitarios según sexo y total, por país, ordenado por subregión




## Gráfico 7-9: Prevalencia de último año de consumo de estimulantes sin prescripción médica en la **población general**, según sexo y total, por país, ordenado por subregión





## Gráfico 7-12: Prevalencia de último año de consumo de estimulantes sin prescripción médica en estudiantes de enseñanza secundaria, según sexo, por país, ordenado por subregión



Different patterns by sex, in different set of countries compared to tranquilizers



OEA

Más derechos  
para más gente

# Some emerging drugs and New Psychoactive Substances

- Early signs of new psychoactive substances such as synthetic cathinones, synthetic cannabinoids, synthetic opioids (including fentanyl), and heroin appearing in the Americas.
- Concern: drugs sold disguised as other drugs (e.g. ecstasy), or blended with other drugs such as benzodiazepines.
  - Both of these are more commonly used by women and girls



# CICAD study among smokable cocaine users accessing treatment 2016

- While men, women were able to access treatment, there were notable differences among the groups.
- LGBT were the least represented group.
- Women were less likely than men to access drug treatment.

(CICAD/OAS; A Review of the availability of care and treatment for smokable cocaine users in at-risk areas, Summary Report 2016)



OEA

Más derechos  
para más gente

# Treatment continued.

- However, once women access treatment, their outcomes are better than males.
  - ♀ Were more likely to stop using.
  - ♀ Showed greater adherence to the program.
  - ♀ Reported better health following treatment



OEA

Más derechos  
para más gente

# Gender differences in substance use in the Americas

- Closing gender gap in alcohol, marijuana, cocaine and crack/cocaine base type substances
  - Gender switch in some Caribbean countries
- Drugs of misuse differ by gender
  - Females more likely to use licit drugs: inhalants, pharmaceuticals without medical prescription



# Gender and drug treatment

- Women and trans persons experience less access to drug treatment than men
- Once women are admitted to treatment, their adherence and post-treatment outcomes are better than males



# Conclusion

- Women and girls are a growing segment of the substance using population.
- Substance use among women and girls is not necessarily the same as men
  - Different drugs of preference, different perceptions of risk associated with use.
- Treatment that addresses women's needs is important and necessary in the Americas.



OEA

Más derechos  
para más gente

# Acknowledgments

- We would like to thank the National Observatory on Drugs in our member states, without whom this report would have not been possible.



## Marya Hynes, M.H.S.

- Jefa Interina del Observatorio Inter-American sobre Drogas (OID)
- Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)
- [Mhynes@oas.org](mailto:Mhynes@oas.org)



**OEA** | Más derechos  
para más gente