



Sekretariát Rady vlády
pro koordinaci
protidrogové politiky

Cómo el estigma limita el acceso de las mujeres consumidoras de drogas a los servicios de drogas

Jindrich Voboril

Coordinador Nacional de Política de Drogas
República Checa

> Mujeres consumidoras de drogas

- "doblemente desviadas" como consumidoras de drogas y como personas que traspasan el rol femenino tradicional impuesto por la sociedad
- aproximadamente un cuarto de todas las personas con problemas serios relacionados con el uso de drogas ilícitas y el 20% de todos los participantes en tratamiento especializado
- el uso de sustancias adictivas como las benzodiazepinas es más común
- menos delitos de propiedad que los hombres y más a menudo apoyan sus hábitos de drogas a través de la industria del sexo (hasta el 60% de las mujeres que usan drogas)
- vulnerabilidades específicas de género a las infecciones transmitidas por la sangre
- mayor proporción de mujeres presas que de varones presos se inyectan drogas-la ausencia de actividades de reducción de daños, especialmente el acceso a jeringuillas limpias puede tener un mayor impacto en las mujeres

> Género – ¿diferenciación o estigmatización?

- ▶ género-más el contexto social, sociológico y cultural de hombres y mujeres en lugar de diferencias biológicas
- ▶ la proporción entre las consumidoras de drogas femeninas y masculinos en el tratamiento tiende a ser de 1:3
- ▶ la proporción entre las consumidoras de drogas femeninas y masculinos en la escena de la droga tiende a ser de 1:2



Muchas razones...

En comparación con los hombres que usan drogas, las mujeres pueden (OEDT):

- ▶ enfrentarse a niveles más altos de estigma y vergüenza;
- ▶ acarrear cargas socioeconómicas más pesadas;
- ▶ recibir menos apoyo social;
- ▶ estar más influenciadas por su papel parental en las cuestiones relacionadas con el uso y la recuperación de drogas;
- ▶ tener una pareja que desempeñe un papel clave (iniciación del uso de drogas, continuación y recidiva, exposición a infecciones transmitidas por la sangre, exposición a violencia)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

> Mujeres consumidoras de drogas

Las mujeres son particularmente más proclives a:

- experimentar el estigma y desventaja económica, menos apoyo social
- Venir de familias con problemas de uso de sustancias y tener una pareja que use sustancias
- tener hijos que puedan desempeñar un papel central papel en su uso y recuperación de las drogas
- haber experimentado abuso sexual y físico y tener trastornos mentales concomitantes





Necesidades específicas de mujeres consumidoras de drogas

Los tipos de respuestas necesarias para este grupo incluyen (OEDT):

1) servicios específicos para mujeres

- ▣ Programas para sexo femenino o mixtos
- ▣ imparciales, apoyo y seguridad física y emocional
- ▣ promover conexiones saludables con los niños, los miembros de la familia y otros

2) colaboración entre el tratamiento farmacológico y los servicios de salud mental

3) servicios de uso de drogas para mujeres embarazadas y padres

- ▣ cuidado de la salud, cuidado infantil, apoyo familiar

4) superar las barreras a la atención de las mujeres involucradas en el comercio sexual

- ▣ apertura nocturna, servicios de extensión móvil, soporte de acceso abierto

5) sensibilidad hacia los aspectos étnicos y culturales

- ▣ servicios de interpretación



> CONCLUSIÓN: ¿Qué tipo de servicio? (1)

Disponibilidad de Servicios (Voboril 2003):

- programas apropiados donde las mujeres cuiden a los niños (comunidades terapéuticas, instalaciones de post-tratamiento, tratamiento en prisiones)
- servicios con asesoramiento para mujeres embarazadas con VIH y VHC, para mujeres anciana y de mediana edad, mujeres que usan medicamentos, etc.
- Asesoramiento para mujeres
- servicios anónimos (asesoramiento telefónico)
- cooperación con médicos generales,etc.

> CONCLUSIÓN: ¿Qué tipo de servicio? (2)

**Específico Género
Problemas (Voboril
2003):**

- anorexia, bulimia
- alto nivel de consumo de drogas
- prevención del uso de drogas dirigida a chicas
- problema específico en la prevención de la enfermedad en salud mental de sexo seguro
- problemas específicos asociados con el embarazo y maternidad, etc.

> Mujeres consumidoras de drogas en la República Checa

drogas ilícitas consumidas por 30,5% de la población en general al menos una vez en la vida

▶ 38,8% de los hombres y 22,7% de las mujeres

Consumo de la sustancia adictiva 17,3% de la población general en los últimos 12 meses

▶ 11,9% de los hombres y 22,3% de las mujeres


Aproximadamente 46.800 consumidores problemáticos de drogas

▶ 30% de las mujeres



Consumidores Problemáticos de Drogas en la República Checa

Consumidores problemáticos de drogas



Año	Número de CPD
2010	39 200
2011	40 200
2012	41 300
2013	45 200
2014	47 700
2015	47 700
2016	46 800

XX

> CDP en Praga 2011

Tabla 5. Resultados generales (valores centrales) obtenidos por el método pesca-repesca incluyendo la encuesta especial en comparación con el método del multiplicador (todas las estimaciones se refieren al año 2011)

Source	Total PDUs	Men	Women	Heroin	Methamphetamine	Cocaine	Buprenorphine	Methadone
CRM	10,754	8,056	2,689	2,581	5,592	64	4,732	860
MM	10,900	n.a.	n.a.	2,200	5,400	n.a.	3,300	n.a.

CRM Método *pesca-repesca*

MM Método *multiplicador*

Estimación de consumidores problemáticos en Praga en 2011 desde datos de bajo umbral: método modificado de captura y recaptura, ajustado para clientes que evitan cualquier identificación (clientes no codificados) (2016):

B. Sopko, K. SKaRUovUnV. NeCasV. MravCIK



> CPD en 2006 y 2007

Tabla 4. Distribución de sexo y edad de estimaciones de CPD en República Checa en 2006 y 2007

Sex	Year	Age groups							Total
		< 15	15-17	18-24	25-34	35-44	45-64	> 64	
Men	2006	60	790	6 042	7 032	1 534	770	179	16 408
	2007	8	1 192	7 256	9 255	2 294	1 126	147	21 278
Women	2006	73	1 062	3 048	1 859	538	764	133	7 477
	2007	41	1 412	3 705	2 775	718	914	139	9 704
Total	2006	133	1 853	9 090	8 891	2 072	1 534	312	23 885
	2007	49	2 604	10 961	12 030	3 012	2 040	286	30 982

Mujeres en Servicios en la República Checa

Type of facility	Number of clients	Proportion (%)		
		women	person under 19	
Sobering up station	21 577	16	1	
Outpatient treatment	> outpatient healthcare facilities - psychiatry	36 419 (7 862)	36	4
	> addictological (medical) ambulance	690	n. a.	n. a.
	> outpatient (non-health) programs	1 471	41	n. a.
Substitution treatment	> substitution treatment register	2 266	29	0
	> annual statement from psychiatrists	2 792	32	0
	> annual statement from general practitioners	494	30	n. a.
Prisons	> drug prevention counseling	9 329	n. a.	n. a.
	> substitution treatment	67	n. a.	n. a.
	> voluntary treatment	578	–	n. a.
	> compulsory (court-ordered) treatment	213	25	n. a.
	> drug-free zones	4 014	4	n. a.
	> NGO programmes	7 090	n. a.	n. a.
Crisis centres	47	43	2	
Psychotherapeutic day care centres	39	72	5	
Special aftercare programmes	2 880	34	n. a.	



Mujeres en Tratamiento en la República Checa

Age group	Total	Men (%)	Women (%)
<15	7	85,7	14,3
15-19	390	50,5	49,5
20-24	619	65,6	34,4
25-29	948	66,8	33,2
30-34	1 373	68,0	32,0
35-39	1 671	75,9	24,1
40-44	908	74,7	25,3
45-49	450	73,6	26,4
50-54	361	69,5	30,5
55-59	224	70,1	29,9
60-64	150	76,7	23,3
≥65	96	63,5	36,5
Total	7 197	70,0	30,0
Average age	35,9	36,5	34,6





Sekretariát Rady vlády
pro koordinaci
protidrogové politiky

**Gracias
para su atención ...**